



## Concours Mathématiques et Physique Épreuve de Mathématiques II

Date: Samedi 9 Juin 2012    Heure : 8 H    Durée: 3 heures    Nb pages: 4  
Barème: Partie I: 5 pts    Partie II-A : 3 pts    Partie II-B: 10 pts    Partie II-C: 2 pts

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté et au soin de la présentation. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.

Il est rappelé que tout résultat énoncé dans le texte peut être utilisé pour traiter la suite, même s'il n'a pu être démontré.

### Rappels et notations

- Pour  $n$  et  $m$  deux entiers supérieurs ou égaux à 1, on note:

- ★  $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices à coefficients dans  $\mathbb{R}$  ayant  $n$  lignes et  $m$  colonnes.

- ★ Lorsque  $n = m$ ,  $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$  est noté plus simplement  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

- ★ Pour  $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ , on note  ${}^tA$  sa matrice transposée et  $rg(A)$  son rang.  $\text{Ker } A$  est le noyau de  $A$ :

$$\text{Ker } A = \{\xi \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}) \mid A\xi = 0\},$$

$\text{Im } A$  est l'image de  $A$ :

$$\text{Im } A = \{A\xi \mid \xi \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})\}.$$

- Pour tout  $k$  entier naturel,  $\mathbb{R}_k[X]$  désigne l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels et de degrés  $\leq k$ .
- $F^\perp$  désigne l'orthogonal d'un sous espace vectoriel  $F$  d'un espace euclidien.

### PARTIE I

Dans cette partie, on identifiera  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  et  $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$  respectivement à  $\mathbb{R}^n$  et  $\mathbb{R}^m$ , que l'on supposera munis de leurs produits scalaires canoniques: pour tout entier  $k \geq 1$ , en particulier  $k = n$  ou  $m$ ,

$$\langle U, V \rangle_k = {}^tUV, \quad \forall U, V \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R}).$$

La norme associée à ce produit scalaire sera notée  $\|\cdot\|_k$ .

Soient  $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$  et  $b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .

1. (a) Vérifier que  $Im A$  est un sous espace vectoriel de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ .
- (b) Soit  $p$  la projection orthogonale de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  sur  $Im A$ .
  - i. Justifier qu'il existe  $\xi_0 \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$  tel que

$$A\xi_0 = p(b).$$

- ii. Montrer que

$$\|A\xi - b\|_n^2 \geq \|A\xi_0 - b\|_n^2, \quad \forall \xi \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}).$$

- iii. Conclure que

$$\min_{\xi \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})} \|A\xi - b\|_n = \|A\xi_0 - b\|_n,$$

c'est à dire  $\xi_0$  rend minimale la valeur de  $\|A\xi - b\|_n$ , lorsque  $\xi$  décrit  $\mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$ .

Dans la suite,  $\xi_0$  sera appelée une **pseudo-solution** du système:

$$A\xi = b. \tag{S1}$$

2. Montrer que si  $Ker A = \{0\}$ , alors le système (S1) admet une pseudo-solution unique.
3. Montrer que  $\xi_0$  est une pseudo-solution du système (S1) si et seulement si, pour tout  $\xi \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})$ ,

$$\langle A\xi, A\xi_0 - b \rangle_n = 0.$$

4. En déduire que  $\xi_0$  est une pseudo-solution de (S1) si et seulement si:

$${}^t A A \xi_0 = {}^t A b. \tag{S2}$$

## PARTIE II

On considère une suite de réels quelconque  $\{y_0, y_1, \dots, y_n\}$  et une suite d'entiers  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  telle que

$$x_i = i, \quad \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Dans cette partie, on suppose  $0 \leq m \leq n$ , et on cherche à trouver les polynômes  $P \in \mathbb{R}_m[X]$  tels que la quantité

$$\Psi_m(P) = \sum_{i=0}^n (y_i - P(x_i))^2$$

soit minimale et à préciser la valeur  $\delta_m$  de ce minimum.

### - A - Minimisation dans $\mathbb{R}_m[X]$

Soit un polynôme  $P$  tel que:

$$P = \sum_{k=0}^m a_k X^k \in \mathbb{R}_m[X], \text{ on lui associe } \xi = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m+1,1}(\mathbb{R}).$$

1. Calculer  $P(x_i)$  pour tout  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ .
2. En déduire qu'il existe une matrice  $A \in \mathcal{M}_{n+1, m+1}(\mathbb{R})$  telle que

$$\begin{pmatrix} P(x_0) \\ P(x_1) \\ \vdots \\ P(x_n) \end{pmatrix} = A\xi.$$

3. Calculer  $rg(A)$ .
4. Trouver  $b \in \mathcal{M}_{n+1, 1}(\mathbb{R})$  tel que  $\Psi_m(P) = \|A\xi - b\|_{n+1}^2$ .
5. Vérifier que

$$\min_{P \in \mathbb{R}_m[X]} \Psi_m(P) = \min_{\xi \in \mathcal{M}_{m+1, 1}(\mathbb{R})} \|A\xi - b\|_{n+1}^2.$$

6. En déduire qu'il existe un unique  $P_m \in \mathbb{R}_m[X]$  tel que

$$\min_{P \in \mathbb{R}_m[X]} \Psi_m(P) = \Psi_m(P_m).$$

On pose  $\Psi_m(P_m) = \delta_m$ .

### - B - Calculs de $P_m$ et $\delta_m$

1. Montrer que l'application

$$(P, Q) \mapsto \langle P, Q \rangle = \sum_{i=0}^n P(x_i)Q(x_i)$$

munit  $\mathbb{R}_n[X]$  d'une structure d'espace euclidien.

Dans ce qui suit, l'espace  $\mathbb{R}_n[X]$  est muni de cette structure euclidienne. La norme d'un polynôme  $P$  est alors  $\|P\| = \sqrt{\langle P, P \rangle}$ .

2. Pour tout  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ , on pose le polynôme  $L_i = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \neq i}} \left( \frac{X - x_k}{x_i - x_k} \right)$ .

- (a) Pour tout  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ , quel est le degré de  $L_i$ ?
- (b) Vérifier que, pour tout  $i, j \in \{0, 1, \dots, n\}$ , on a

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq i, \\ 1 & \text{si } j = i. \end{cases}$$

- (c) Montrer que la famille  $(L_0, L_1, \dots, L_n)$  est une base orthonormale de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
- (d) Pour tout  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ , quelles sont les coordonnées de  $P$  dans la base  $(L_i)_{0 \leq i \leq n}$ .

3. A la famille  $(y_i)_{0 \leq i \leq n}$ , on associe le polynôme  $Y = \sum_{i=0}^n y_i L_i$ .

- (a) Que vaut  $Y(x_j)$ , pour  $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

(b) Montrer que

$$\min_{P \in \mathbb{R}_m[X]} \Psi_m(P) = \min_{P \in \mathbb{R}_m[X]} \|Y - P\|^2.$$

(c) En déduire que  $P_m$ , défini dans la question A-6, est le projeté orthogonal de  $Y$  sur  $\mathbb{R}_m[X]$ .

4. On définit une suite  $(Q_k)_{0 \leq k \leq n}$  de polynômes de  $\mathbb{R}_n[X]$  par récurrence:

$$\begin{cases} Q_0 = 1, \\ Q_k = X^k - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{\langle X^k, Q_i \rangle}{\|Q_i\|^2} Q_i, \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

(a) Calculer  $Q_1$ .

(b) Vérifier que chaque polynôme  $Q_k$  est de degré  $k$ .

(c) Montrer la relation d'orthogonalité :

$$\forall k, k' \in \{0, 1, \dots, n\} \text{ et } k \neq k', \quad \langle Q_k, Q_{k'} \rangle = 0.$$

(d) Conclure que la famille  $\{Q_0, Q_1, \dots, Q_n\}$  est une base orthogonale de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

(e) Pour  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ , on pose  $H_k(X) = Q_k(x_n - X)$  (le polynôme associé à la fonction polynômiale  $x \mapsto Q_k(x_n - x)$ ).

i. Montrer que, pour tout  $j = 0, 1, \dots, (k-1)$ , on a  $\langle H_k, X^j \rangle = 0$ .

ii. En déduire que  $H_k$  est orthogonal au sous espace vectoriel  $\mathbb{R}_{k-1}[X]$  de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

iii. Trouver une relation entre les polynômes  $H_k$  et  $Q_k$ .

(f) i. Vérifier que

$$\langle P_m, Q_i \rangle = \langle Y, Q_i \rangle, \quad \forall i = 0, 1, \dots, m.$$

ii. Montrer que

$$P_m = \sum_{i=0}^m \frac{\langle Y, Q_i \rangle}{\|Q_i\|^2} Q_i.$$

iii. En déduire que, pour tout  $m \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,

$$\begin{cases} P_m = P_{m-1} + \frac{\langle Y, Q_m \rangle}{\|Q_m\|^2} Q_m, \\ \delta_m = \delta_{m-1} - \frac{(\langle Y, Q_m \rangle)^2}{\|Q_m\|^2}. \end{cases} \quad (S3)$$

iv. Que peut-on dire de  $P_n$  et  $\delta_n$ ?

### - C - Exemple

Soit  $n = 3$ . On prend  $y_0 = 1, y_1 = 2, y_2 = 1$  et  $y_3 = 2$ .

1. Pour  $m = 0$ , trouver  $P_0$  et  $\delta_0$  (on pourra utiliser le système (S2)).

2. Pour  $m = 1$ , trouver  $P_1$  et  $\delta_1$  (on pourra utiliser le système (S3)).

3. Tracer sur le même graphique les deux fonctions polynômiales  $P_0(x)$  et  $P_1(x)$  avec la suite des points  $(i, y_i)_{0 \leq i \leq 3}$ .